TATTOO EN NIÑO

Silvia Bonzani, Jorge S. Alvarez
Instituto de Diagnóstico y Tratamiento C. Oulton, Córdoba – Capital.

Los pigmentos en la piel pueden producir reacciones inflamatorias, alérgicas, infecciosas, micro traumatismos y complicaciones como ampollas y queloides.

Las complicaciones suelen son leves.

Se presenta un paciente de nueve años de edad que en sus vacaciones, estando en la playa con consentimiento de los padres, le realizan un tatuaje en el brazo izquierdo, con un auto adhesivo, siendo retirado a los pocos minutos. El tatuaje aparentemente tenía un pigmento en base a henna.

El niño comienza con prurito y eritema a la hora de realizado el tatuaje.

La madre le remueve gran parte del tatuaje con cepillado, agua y jabón. El prurito persiste por 48 hs.

Sorprende la persistencia de la imagen, siendo esta nítida, e inclusive sin relieve con forma de dragón. Consulta en dermatología, se indica clobetasol tópico con mejoría subjetiva sintomática.

Figura 1: imagen sobre elevada y ligeramente hiperpigmentada en el momento de la consulta.

Consulta nuevamente a la semana, en donde se observa persistencia de la imagen, sin eritema ni sobre elevación; ver **figura 2.**

Comentario:

Se presenta el caso de un niño que al realizarse un tatuaje con un auto adhesivo renovable, no permanente, presento eritema, prurito y lesiones tardías que no resolvieron inmediatamente después de remover la tintura. La aparente inocuidad del tatuaje auto adhesivo no fue tal, persistiendo el mismo e inclusive presentando lesiones tardías que incluyen la sobreelevación y la hiperpigmentación.

(Palabra clave: Urticaria de contacto – dermatitis de contacto).